

**Załączniki do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia ...**

Załącznik nr 1

Medyczne czynności ratunkowe, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego

Część I

1. Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i podjęcie decyzji o dalszych medycznych czynnościach ratunkowych.
2. Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń.
3. Prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo – oddechowej u dorosłych i dzieci według obowiązujących standardów.
4. Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych.
5. Przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem w szczególności:
 - 1) rurki ustno – gardłowej;
 - 2) rurki nosowo – gardłowej.
6. Odsysanie dróg oddechowych.
7. Podawanie tlenu.
8. Wspomaganie oddechu lub prowadzenie wentylacji zastępczej z użyciem:
 - 1) maski twarzowej;
 - 2) maski krtaniowej;
 - 3) zastawki oddechowej;
 - 4) worka samorozprężalnego;
 - 5) respiratora transportowego.
9. Intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta lub przez nos, bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji zastępczej z użyciem zastawki i worka samorozprężalnego.
10. Intubacja dotchawicza w nagłym zatrzymaniu krążenia rurką dwuświatłową.
11. Wykonanie ekstubacji.
12. Wykonanie konikopunkcji przy braku możliwości wykonania intubacji.

13. Wykonanie defibrylacji ręcznej pod kontrolą EKG.
14. Wykonanie defibrylacji automatycznej lub półautomatycznej.
15. Wykonanie EKG.
16. Monitorowanie czynności układu oddechowego.
17. Monitorowanie czynności układu krwionośnego.
18. Wykonanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych oraz żyły szyjnej zewnętrznej.
19. Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą i wziewną oraz doszpikową przy użyciu igły automatycznej.
20. Ocena świadomości pacjenta według skali Glasgow oraz ocena szerokości źrenic i ich reakcji na światło.
21. Nakłucie jamy opłucnowej w odmie prężnej, potwierdzonej badaniem fizykalnym.
22. Cewnikowanie pęcherza moczowego.
23. Zakładanie sondy żołądkowej.
24. Pobieranie krwi żyłnej i włosniczkowej do badań laboratoryjnych.
25. Oznaczanie stężenia glukozy przy użyciu glukometru.
26. Opatrywanie ran.
27. Tamowanie krwotoków.
28. Unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń.
29. Unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego.
30. Odebranie porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych.
31. Segregacja medyczna w przypadku zdarzeń masowych i katastrof.
32. Podejmowanie działań profilaktycznych w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia.
33. Przygotowanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu.
34. Podawanie leków wymienionych w tabeli.

Nazwa leku	Postać	Droga podania
Acetylsalicylic acid	tabletki 0,5 g	doustnie
Adenosine	roztwór do wstrzyknięcia 6 mg/2ml	dożylnie
Amiodarone	roztwór do wstrzyknięcia 150 mg/3ml	dożylnie
Atropinum sulfuricum	roztwór do wstrzyknięcia (0,5 mg/ml;	domięśniowo, podskórnie lub

	1 mg/ml)	dożylnie
Butylscopolamine	roztwór do wstrzyknięcia 20 mg/ml	dożylnie, domięśniowo, podskórnice
Carbo medicinalis	tabletki	doustnie
Clemastine	roztwór do wstrzyknięcia 2 mg/2 ml	dożylnie
Diazepam	roztwór do wstrzyknięcia (10 mg/2 ml)	domięśniowo lub dożylnie
Dopaminum hydrochloricum	roztwór do wstrzyknięcia w bolusie 200 mg/5 ml	dożylnie
Drotaverine hydrochloride	roztwór do wstrzyknięcia 40 mg/ 2 ml	dożylnie, domięśniowo, podskórnice
Epinephrine bitartrate	roztwór do wstrzyknięcia (1 mg/ml)	domięśniowo, podskórnice, dożylnie doszpikowo, dotchawiczo
Fenoterol hydrobromide	aerozol wziewny	wziewnie
Flumazenil	roztwór do wstrzyknięcia 500µg/5ml	dożylnie
Furosemide	roztwór do wstrzyknięcia (20 mg/2 ml)	domięśniowo lub dożylnie
Glucagon hydrochloride	roztwór do wstrzyknięcia 1 mg/fiol + rozpuszczalnik	domięśniowo
Glucosum 20%	roztwór do wstrzyknięcia dożylnego (200 mg/ml)	dożylnie
Glyceryl trinitrate	tabletki 0,5 mg, aerozol do stosowania podjęzykowego	podjęzykowo
Hydrocortisone lub w razie braku po konsultacji z lekarzem Methylprednisolone	roztw. do wstrzyknięć (Hydrocortisone 100 mg/ml; 250 mg/2ml), (Methylprednisolone 500mg/fiol, 1 g/fiol).	dożylnie
Magnesii sulfuricum	roztwór do wstrzyknięcia w bolusie 2 g/10 ml	dożylnie
Metamizole sodium	roztwór do wstrzyknięcia 2,5 g/5 ml	głęboko domięśniowo
Metoclopramidum	roztwór do wstrzyknięcia 10mg/2 ml	dożylnie, domięśniowo
Morphine sulphate	roztwór do inj. (10 mg/ml; 20 mg/ml)	domięśniowo, podskórnice lub dożylnie
Naloxonum hydrochloricum	roztwór do wstrzyknięcia (400 µg/ml)	domięśniowo, podskórnice lub dożylnie
Natrium chloratum 0,9%	roztwór do wlewu dożylnego	dożylnie
Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny	roztwór do wlewu dożylnego	dożylnie
Salbutamol	aerozol wziewny	wziewnie
Solutio Ringeri	roztwór do wlewu dożylnego	dożylnie
Tlen	gaz	wziewnie, dotchawiczo

35. Stwierdzanie biologicznych znamion śmierci, a w razie ich stwierdzenia, podejmowanie decyzji o odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych.