

## PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

### I.A. SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE DZIECI I MŁODZIEŻY WEDŁUG WIEKU

Wiek	Szczepienie przeciw	Uwagi	
1 rok życia	w ciągu 24 godzin po urodzeniu	<p>WZW typu B – domięśniowo (<i>pierwsza dawka</i>)</p> <p>GRUŻLICY - śródskórną szczepionką BCG</p>	<p>Szczepienie noworodków przeciw gruźlicy powinno być wykonane jednocześnie ze szczepieniem przeciw WZW typu B lub w dowolnym momencie przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego.</p> <p>Patrz również "Informacje uzupełniające" - część III PSO.</p>
	2 miesiąc życia ( 6-8 tydzień)	<p>WZW typu B – domięśniowo (<i>druga dawka</i>)</p> <p>BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (<i>pierwsza dawka</i>) - podskórną lub domięśniowo szczepionką DTP</p> <p>zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b - domięśniowo lub podskórną (<i>pierwsza dawka</i>)</p>	<p>Drugą dawkę szczepionki WZW typu B należy podać w 6-8 tygodniu życia jednocześnie z pierwszą dawką szczepionki DTP, a dawkę trzecią na przełomie 6 i 7 miesiąca życia. Trzy dawki szczepienia podstawowego DTP podawane są w odstępach 6-8 tygodniowych.</p> <p>Dzieciom z przeciwwskazaniami do szczepienia przeciw krztuścowi szczepionką pełnokomórkową (DTPw) należy zastosować domięśniowo szczepionkę bezkomórkową (DTaP) w cyklu obowiązkowego szczepienia DTP. W przypadku orzeczenia całkowitego przeciwwskazania do szczepienia przeciw krztuścowi należy zastosować szczepionkę DT wg wskazań producenta. Patrz również - „Informacje uzupełniające” - część III PSO.</p> <p>Trzy dawki szczepienia podstawowego przeciw HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b podawane są w odstępach 6-8 tygodniowych.</p> <p>Szczepionkę przeciw HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b można stosować jednocześnie z innymi szczepionkami, np. DTP, IPV, WZW typu B, ale w oddzielnych iniekcjach lub w postaci preparatów skojarzonych np. DTaP-HIB, DTP-IPV-HIB, DTaP-IPV-HIB, DTaP-IPV-HIB-HBV – preparaty te nie są finansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia.</p> <p>Patrz również „Informacje uzupełniające” – część III PSO.</p>
	3-4 miesiąc życia (po 6-8 tygodniach od poprzedniego szczepienia)	<p>BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (<i>druga dawka</i>) - podskórną lub domięśniowo szczepionką DTP</p> <p>POLIOMYELITIS - podskórną lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa) (<i>pierwsza dawka</i>)</p> <p>zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b - domięśniowo lub podskórną (<i>druga dawka</i>)</p>	<p>Szczepienie przeciw POLIOMYELITIS dzieci w 1 roku życia pierwsze dwie dawki - <b>szczepionką inaktywowaną IPV</b>. Pierwsza dawka na przełomie 3 i 4 miesiąca życia podawana jest jednocześnie z drugą dawką szczepionki DTP. Druga dawka w 5 miesiącu życia podawana jest jednocześnie z trzecią dawką szczepionki DTP.</p>

	5-6 miesiąc życia (po 6-8 tygodniach od poprzedniego szczepienia)	<p>BŁONICY, TEŻCOWI, KRZTUŚCOWI (<i>trzecia dawka</i>) - podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP</p> <p>POLIOMYELITIS - podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa) (<i>druga dawka</i>)</p> <p>zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b - domięśniowo lub podskórnie (<i>trzecia dawka</i>)</p>	
	7 miesiąc życia	WZW typu B – domięśniowo ( <i>trzecia dawka</i> )	
2 rok życia	13-14 miesiąc życia	<p>ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE - podskórnie żywą szczepionką skojarzoną (<i>pierwsza dawka</i>)</p>	Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia, należy ją podać po upływie nie wcześniej niż po 4 tygodniach od wyzdrowienia.
	16-18 miesiąc życia	<p>BŁONICY, TEŻCOWI, KRZTUŚCOWI (<i>czwarta dawka</i>) - podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP</p> <p>POLIOMYELITIS - podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa) (<i>trzecia dawka</i>).</p> <p>zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b - domięśniowo lub podskórnie</p>	<p>Czwarta dawka, uzupełniająca szczepienia podstawowego DTP i trzecia dawka uzupełniająca szczepienia podstawowego przeciw polio.</p> <p>Dzieci z przeciwwskazaniami do podania preparatu zawierającego komórkowy komponent krztuśca, które w 1 roku życia otrzymały trzy dawki DTaP, należy zaszczyć domięśniowo czwartą dawką DTaP.</p> <p>Czwarta dawka, uzupełniająca szczepienia podstawowego przeciw HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b.</p>
okres przed-szkolny	6 rok życia	<p>BŁONICY, TEŻCOWI, KRZTUŚCOWI - domięśniowo szczepionką <b>DTaP</b> zawierająca bezkomórkowy komponent krztuśca</p> <p>POLIOMYELITIS - <b>doustnie</b> szczepionką atenuowaną poliwalentną <b>OPV</b> (1,2,3 typ wirusa)</p>	<p>Pierwsza dawka przypominająca szczepionki przeciw błonicy, teżcowi i krztuścowi (komponent bezkomórkowy).</p> <p>Patrz również - „Informacje uzupełniające” - część III PSO.</p> <p>Pierwsza dawka przypominająca - szczepionka atenuowana (OPV).</p>

Szkoła podstawowa i gimnazjum	10 rok życia	ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE - podskórną żywą szczepionką skojarzoną	Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia, należy ją podać po upływie co najmniej 2 miesięcy od wyzdrowienia. <b>Patrz również - „Informacje uzupełniające” - część III PSO.</b>
	11 rok życia	ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE - podskórną żywą szczepionką skojarzoną	Szczepieniu podlegają <b>wyłącznie dziewczęta</b> nie szczepione w 10 roku życia. Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia. Szczepionkę należy podać po upływie, co najmniej 2 miesięcy od wyzdrowienia.
	12 rok życia	ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE - podskórną żywą szczepionką skojarzoną	Szczepieniu podlegają <b>wyłącznie dziewczęta</b> nie szczepione w 10 lub 11 roku życia. Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia. Szczepionkę należy podać nie wcześniej niż po 4 tygodniach od wyzdrowienia.
	14 rok życia	WZW typu B - domięśniowo, 3-krotnie w cyklu 0; 1; 6 miesięcy  BŁONICY, TĘŻCOWI - podskórną lub domięśniowo szczepionką Td	Szczepienie należy podać młodzieży w gimnazjum (I lub II klasa). <b>Nie należy szczepić osób uprzednio zaszczepionych</b> podstawowo przeciw WZW typu B w ramach szczepień zalecanych lub obowiązkowych. <b>Nie przewiduje się podawania dawek przypominających.</b>  Dawka przypominająca. Szczepienie można podać jednocześnie (tzn. w ciągu 24 godz.) z jedną z dawek szczepionki przeciw WZW typu B w oddzielnej iniekcji.
Szkoła ponadpodstawowa	19 rok życia lub ostatni rok nauki w szkole	BŁONICY, TĘŻCOWI - podskórną lub domięśniowo szczepionką Td	Trzecia dawka przypominająca; nie powinna być podana wcześniej niż po upływie 5 lat od ostatniej dawki szczepionki Td.