

## I. B. SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE OSÓB NARAŻONYCH W SPOSÓB SZCZEGÓLNY NA ZAKAŻENIE

Szczepienie przeciw	Osoby podlegające szczepieniu	Uwagi
WZW typu B - domięśniowo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- osoby wykonujące zawody medyczne narażone na zakażenie,</li> <li>- uczniowie średnich i policealnych szkół medycznych, studenci akademii medycznych i innych uczelni wyższych kształcących na kierunkach medycznych, w ciągu pierwszego roku szkolnego akademickiego,</li> <li>- osoby z bliskiego otoczenia chorych na WZW typu B i nosicielei HBV (domownicy oraz osoby przebywające w zakładach opiekuńczych, wychowawczych i zakładach zamkniętych),</li> <li>- chorzy z przewlekłym uszkodzeniem nerek, zwłaszcza osoby dializowane oraz z przewlekłym uszkodzeniem wątroby o etiologii wirusowej, autoimmunologicznej, metabolicznej lub alkoholowej, w szczególności z przewlekłym zakażeniem HCV,</li> <li>- zakażeni HIV a także dzieci z wrodzonym lub nabytym defektem odporności,</li> <li>- osoby przygotowywane do zabiegów wykonywanych w krążeniu pozaustrojowym.</li> </ul>	<p>Szczepienia podstawowe w/g schematu: 0; 1; 6 miesięcy. Nie należy szczepić osób uprzednio zaszczepionych podstawowo przeciw WZW typu B. Rutynowych szczepień przypominających nie przewiduje się.</p> <p style="text-align: center;"><b>Schemat szczepienia według wskazań lekarza oraz producenta.</b></p> <p>Przewiduje się <b>dawki przypominające</b> szczepionki dla osób z chorobami przewlekłymi, zwłaszcza osób dializowanych oraz z niedoborami odporności. U tych osób należy stosować dawki przypominające w celu utrzymania stężenia przeciwciał anty HBs powyżej poziomu ochronnego (10 j.m./l).</p>
ZAKAŻENIOM HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b - domięśniowo lub podskórnice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dzieciom do ukończenia 2 roku życia nie zaszczepionym w schemacie podstawowym od 2 miesiąca życia - dawkowanie wg wskazań producenta szczepionki.</li> </ul>	<p>Cykl szczepień dla dzieci w 1 lub 2 roku życia nie zaszczepionych w schemacie podstawowym od 2 miesiąca życia. Można stosować jednocześnie z innymi szczepionkami, np. DTP, IPV, WZW typu B, ale w oddzielnych iniekcjach lub w postaci preparatów skojarzonych np. DTaP-HIB, DTP-IPV-HIB, DTaP-IPV-HIB, DTaP-IPV-HIB-HBV – preparaty te nie są finansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia. Patrz również „Informacje uzupełniające” – część III PSO.</p>
BŁONICY - podskórnice szczepionką monowalentną (d, D), lub skojarzoną ze szczepionką przeciwężcowi (Td, DT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ze wskazań indywidualnych,</li> <li>- osoby ze styczności z chorymi na błonicę,</li> <li>- w zależności od sytuacji epidemiologicznej.</li> </ul>	<p>Szczepienia w zależności od sytuacji epidemiologicznej - o ile obowiązek szczepień zostanie nałożony w drodze rozporządzenia przez Ministra Zdrowia lub w drodze rozporządzeń wydawanych przez wojewodów.</p>
DUROWI BRZUSZNEMU - podskórnice szczepionką monowalentną (Ty), lub skojarzoną ze szczepionką przeciwężcowi (TyT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ze wskazań indywidualnych,</li> <li>- w zależności od sytuacji epidemiologicznej.</li> </ul>	<p>Szczepienia w zależności od sytuacji epidemiologicznej - o ile obowiązek szczepień zostanie nałożony w drodze rozporządzenia przez Ministra Zdrowia lub w drodze rozporządzeń wydawanych przez wojewodów.</p>
WŚCIEKLIŹNIE - domięśniowo lub podskórnice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ze wskazań indywidualnych, osoby podejrzane o zakażenie wirusem wścieklizny.</li> </ul>	<p>Patrz również - „Informacje uzupełniające” - część III PSO.</p>
TĘŻCOWI - podskórnice	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ze wskazań indywidualnych, osoby narażone na zakażenie tężcem,</li> <li>- w zależności od sytuacji epidemiologicznej.</li> </ul>	<p>Szczepienie w zależności od sytuacji epidemiologicznej o ile obowiązek szczepień zostanie nałożony.</p>